ВЕСТНИК

ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Журнал выходит 24 раза в год, по четыре номера каждой серии

МАТЕМАТИКА □ МЕХАНИКА □ АСТРОНОМИЯ

Выпуск 3

июль

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

УДК 533.6.011.8

Ю. Шлажа

АСИМПТОТИКА МАКРОПАРАМЕТРОВ ГАЗА ПРИ ГИПЕРЗВУКОВОМ ТЕЧЕНИИ ОКОЛО НОСКА ПЛАСТИНКИ

Математическое изучение специфических свойств пограничного слоя в разреженном газе сопряжено с характерным явлением асимптотической неравномерности [1]. Исследованию пограничного слоя в случае полубесконечной пластинки посвящено большое количество работ разных авторов. Так как возможности феноменологического исследования пограничного слоя ограничены и уравнения кинетической теории газов вблизи поверхности тела сложны, то много проблем еще не решено, особенно проблемы, относящиеся к формированию пограничного слоя у носка пластинки, где возникают продольные градиенты.

В настоящей работе на основе метода из [2] в первом приближении исследована структура неравномерной асимптотики макропараметров газа вблизи поверхности и передней кромки пластинки при больших числах Маха.

§ 1. Первое приближение для макропараметров газа

Рассмотрим гиперзвуковое продольное обтекание бесконечно тонкой пластинки $y=0$, $x \geq 0$ (рис. 1) одноатомным разреженным газом, средняя безразмерная скорость которого равна $\bar{U}_0 = \{1, 0, 0\}$.

Допустим, что молекулы являются гладкими упругими шарами, их отражение от стенки диффузное и температура поверхности не отличается от температуры газа. Найдем асимптотические выражения для макропараметров газа при $M \rightarrow \infty$.

Обтекание тела разреженным одноатомным газом можно описывать системой кинетических уравнений С. В. Валландера [1], которая в стационарном случае имеет вид

$$f(\bar{r}, \bar{u}) = \begin{cases} f^+ = \frac{1}{u_n} \tilde{\Phi}(\bar{r}_s, \bar{u}) \Pi(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) + \int_0^{\tau_s} \Phi(\bar{r} - \tau \bar{u}, \bar{u}) \Pi(\bar{r}, \bar{u}, \tau) d\tau; \\ f^- = \int_0^{\infty} \Phi(\bar{r} - \tau \bar{u}, \bar{u}) \Pi(\bar{r}, \bar{u}, \tau) d\tau; \end{cases} \quad \begin{matrix} \bar{u} \in \Omega^+(\bar{r}) \\ \bar{u} \in \Omega^-(\bar{r}) \end{matrix} \quad (1,1)$$

где $\Omega^+(\bar{r})$ — конус в пространстве скоростей, содержащий все скорости $\bar{u}$, с которыми молекулы могут прийти с тела в точку $\bar{r}$ без столкновений; $\Omega^-(\bar{r})$ — оставшаяся часть пространства скоростей.

В дальнейшем все величины безразмерны и отмеченные индексом „+“ относятся к части пространства скоростей Ω^+ , а индексом „-“ к части Ω^- . Введем обозначение

$$\{B\}^\pm = B^+ + B^-, \tag{1,2}$$

где B может быть скаляром, вектором или тензором. Для функций, которые входят в правые части (1,1), имеем следующие выражения [1]:

$$\tilde{\Phi}(\bar{r}_s, \bar{u}) = N(\bar{r}_s) \tilde{T}(\bar{u}), \tag{1,3}$$

где

$$N(\bar{r}_s) = - \iint_{u_n=0} f(\bar{r}_s, \bar{u}) u_n d\bar{u} \tag{1,4}$$

и $\tilde{T}(\bar{u})$ при диффузном отражении имеет вид

$$\tilde{T} = \frac{2h^2}{\pi} u_n e^{-hu^2}. \tag{1,5}$$

Далее:

$$\Pi(\bar{r}, \bar{u}, \tau) = \exp \left\{ - \int_0^\tau Q(\bar{r} - q\bar{u}, \bar{u}) dq \right\}, \tag{1,6}$$

где

$$Q(\bar{r}, \bar{u}) = \{Q(\bar{r}, \bar{u})\}^\pm \tag{1,7}$$

и

$$Q^\pm(\bar{r}, \bar{u}) = \iint_{\Omega^\pm(\bar{r})} |\bar{u} - \bar{u}_1| f^\pm(\bar{r}, \bar{u}_1) d\bar{u}_1. \tag{1,8}$$

Аналогично,

$$\Phi(\bar{r}, \bar{u}) = \Phi^{++}(\bar{r}, \bar{u}) + 2\Phi^{+-}(\bar{r}, \bar{u}) + \Phi^{--}(\bar{r}, \bar{u}), \tag{1,9}$$

где

$$\Phi^{\pm\Delta}(\bar{r}, \bar{u}) = \iiint_{\Omega^\pm} \iiint_{\Omega^\Delta} |\bar{u}_1 - \bar{u}_2| f^\pm(\bar{r}, \bar{u}_1) f^\Delta(\bar{r}, \bar{u}_2) T(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}) d\bar{u}_1 d\bar{u}_2 \tag{1,10}$$

и для гладких упругих шарообразных молекул

$$T(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}) = \frac{1}{\pi |\bar{u}_1 - \bar{u}_2|^2} \delta \left\{ \left| \bar{u} - \frac{\bar{u}_1 + \bar{u}_2}{2} \right| - \frac{|\bar{u}_2 - \bar{u}_1|}{2} \right\}, \tag{1,11}$$

ε и Δ могут быть как „+“ так и „-“. В (1,9) Φ^{++} характеризует взаимодействие между собой отраженных молекул, Φ^{--} — взаимодействие между собой падающих молекул, а Φ^{+-} — взаимодействие между отраженными и падающими молекулами.

Следуя методу из [2], функцию распределения можно представить в виде

$$f^\pm(\bar{r}, \bar{u}) = f_0(\bar{u}) \sum_{m=0}^{\infty} a_m^\pm(\bar{r}) \psi_m^\pm(\bar{r}, \bar{u}), \tag{1,12}$$

где

$$f_0 = \left(\frac{h}{\pi} \right)^{3/2} e^{-h(\bar{u} - \bar{U}_0)^2}, \quad h = \frac{5}{6} M^2, \tag{1,13}$$

f_0 — максвелловская функция распределения; $\psi_m^\pm$ — полиномы, ортогональные в $\Omega^\pm$ с весом f_0 , и $a_m^\pm$ — коэффициенты разложения. Полиномы $\psi_m^\pm$ можно строить по следующей схеме [2]:

$$\psi_m^\pm = \sigma_m^\pm \varphi_m - \sum_{k=0}^{m-1} \delta_{mk}^\pm \varphi_k, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \tag{1,14}$$

Рис. 1.

A — пластинка $y=0, x>0$; $K(\bar{r})$ — конус с вершиной в точке (x, y, z) , под которым видна полубесконечная пластинка.

где $\{\varphi_m\}$ — последовательность линейно независимых тензоров $\{u_{i_1} u_{i_2} \dots u_{i_m}\}_{i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_m}$, ($i_m = 1, 2, 3$; $m = 0, 1, 2, \dots$; u_i — компоненты вектора скорости молекул $\bar{u}$ и индексы 1, 2, 3 соответствуют индексам x, y, z) m -го ранга третьего порядка и

$$\sigma_m^\pm = \frac{1}{\|\theta_m\|^\pm}, \quad \delta_{mk}^\pm = \sigma_m^\pm b_{mk}^\pm, \quad (1,15)$$

$$b_{mk}^\pm = \frac{1}{\alpha_{00}^\pm} \left\{ d_{mk}^\pm - \sum_{i=1}^{m-1} b_{ik}^\pm d_{mi}^\pm \right\}, \quad (1,16)$$

$$d_{mk}^\pm = \frac{1}{\|\theta_k\|^\pm} \left\{ \alpha_{mk}^\pm - \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_{mi}^\pm b_{ki}^\pm \right\}, \quad (1,17)$$

$$\|\theta_m\|^\pm = \frac{1}{\alpha_{00}^\pm} \left\{ \alpha_{mm}^\pm - 2 \sum_{k=0}^{m-1} b_{mk}^\pm \alpha_{mk}^\pm - \sum_{i,k=0}^{m-1} b_{mi}^\pm b_{mk}^\pm \alpha_{ik}^\pm \right\}, \quad (1,18)$$

$$\alpha_{ij}^\pm = \iiint_{\Omega^\pm} f_0 \varphi_i \varphi_j d\bar{u}, \quad i, j = 0, 1, 2, \dots; \quad \alpha_{ij}^\pm = \alpha_{ji}^\pm. \quad (1,19)$$

Подставляя разложение функции распределения (1,12) в формулы (1,3) — (1,10) и принимая во внимание (1,14), получим для $N, Q^\pm$ и $\Phi^{\pm\Delta}$

$$N(\bar{r}_s) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m^-(\bar{r}_s) \tilde{\beta}_m^-(\bar{r}_s), \quad (1,20)$$

здесь

$$\tilde{\beta}_m^-(\bar{r}_s) = \sigma_m^-(\bar{r}_s) \beta_m^- - \sum_{k=0}^{m-1} \delta_{mk}^-(\bar{r}_s) \beta_k^-, \quad (1,21)$$

$$\beta_m^- = - \iiint_{u_n < 0} u_n f_0 \varphi_m d\bar{u}, \quad m = 0, 1, 2, \dots; \quad (1,22)$$

$$Q^\pm(\bar{r}, \bar{u}) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m^\pm(\bar{r}) \tilde{A}_m^\pm(\bar{r}, \bar{u}), \quad (1,23)$$

где

$$\tilde{A}_m^\pm(\bar{r}, \bar{u}) = \sigma_m^\pm(\bar{r}) A_m^\pm(\bar{r}, \bar{u}) - \sum_{k=0}^{m-1} \delta_{mk}^\pm(\bar{r}) A_k^\pm(\bar{r}, \bar{u}), \quad (1,24)$$

$$A_m^\pm(\bar{r}, \bar{u}) = \iiint_{\Omega^\pm} |\bar{u} - \bar{u}_1| \varphi_m(\bar{u}_1) f_0(\bar{u}_1) d\bar{u}_1; \quad (1,25)$$

$$\Phi^{\pm\Delta}(\bar{r}, \bar{u}) = \sum_{i,j=0}^{\infty} a_i^\pm(\bar{r}) a_j^\pm(\bar{r}) \tilde{B}_{ij}^{\pm\Delta}(\bar{r}, \bar{u}), \quad (1,26)$$

где

$$\tilde{B}_{ij}^{\pm\Delta} = \sigma_i^\pm \sigma_j^\pm B_{ij}^{\pm\Delta} - \sigma_i^\pm \sum_{k=0}^{j-1} \delta_{jk}^\pm B_{ik}^{\pm\Delta} - \sigma_j^\pm \sum_{k=0}^{i-1} \delta_{ik}^\pm B_{jk}^{\pm\Delta} + \sum_{l=0}^{i-1} \sum_{k=0}^{j-1} \delta_{il}^\pm \delta_{jk}^\pm B_{lk}^{\pm\Delta}, \quad (1,27)$$

$$B_{ij}^{\pm\Delta}(\bar{r}, \bar{u}) = \iiint_{\Omega^\pm} \iiint_{\Omega^\pm} \varphi_i(\bar{u}_1) \varphi_j(\bar{u}_2) |\bar{u}_1 - \bar{u}_2| f_0(\bar{u}_1) f_0(\bar{u}_2) \times \\ \times T(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}) d\bar{u}_1 d\bar{u}_2. \quad (1,28)$$

Как видно из (1,15) — (1,19), можно выразить $\delta_{mk}^\pm$ в формулах (1,21), (1,24) и (1,27) через интегралы $\alpha_{ij}^\pm$. Далее при $h \rightarrow \infty$ можно асимптотически исследовать интегралы $\alpha_{ij}^\pm, \beta_m^-, A_m^\pm, B_{ij}^{\pm\Delta}$ из (1,19),

(1,22), (1,25) и (1,28), так как в подынтегральную функцию входит максвелловская функция распределения f_0 . Трехкратные интегралы $\alpha_{ij}^\pm$, $\beta_m^\pm$, $A_m^\pm$ оцениваются сравнительно легко. При асимптотическом исследовании шестикратных интегралов $B_{ij}^{\pm\Delta}$ возникают некоторые трудности, связанные с δ -функцией, входящей через $T(\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u})$ в подынтегральную функцию. Одна квадратура в интегралах $B_{ij}^{\pm\Delta}$ отпадает из-за δ -функции, но дальнейшее интегрирование по пятиразмерной гиперповерхности приводит к трудностям, порождаемым формой обтекаемого тела. Подставляя теперь в (1,1) разложение (1,12), умножая соответственно на ψ_m^+ и ψ_m^- и производя интегрирование по Ω^+ и Ω^- , придем, ввиду ортонормированных полиномов $\psi_m^\pm$, к бесконечной системе интегральных моментных уравнений

$$a_m^\pm = \iint\limits_{\Omega^\pm} \psi_m^\pm V^\pm f^\pm d\bar{u}, \quad m=0, 1, 2, \dots \quad (1,29)$$

Здесь $V^\pm f^\pm$ — правые части в (1,1). Введем следующие обозначения

$$M_i^\pm = \iint\limits_{\Omega^\pm} \varphi_i f^\pm d\bar{u}, \quad i=0, 1, 2, \dots \quad (1,30)$$

Умножая разложение (1,12) на (1,14) и интегрируя по Ω^+ и Ω^- , получим следующие соотношения:

$$M_m^\pm = \frac{1}{\sigma_m^\pm} \left[a_m^\pm + \sum_{k=0}^{m-1} \delta_{mk}^\pm M_k^\pm \right], \quad m=0, 1, 2, \dots \quad (1,31)$$

Выражая в этой формуле последовательно $M_m^\pm$ через $a_m^\pm$ и принимая во внимание (1,16) и (1,17), перепишем (1,31) в виде

$$M_i^\pm = \sum_{k=0}^i c_{ik}^\pm a_k^\pm, \quad i=0, 1, 2, \dots, \quad (1,32)$$

где

$$c_{ik}^\pm = \begin{cases} \frac{\|0_k\|^\pm}{\alpha_{00}^\pm} d_{ik}^\pm & \text{при } k \neq i, \\ \frac{1}{\sigma_i^\pm} & \text{при } k = i. \end{cases}$$

Принимая во внимание (1,2) и (1,30), можно выразить плотность, среднюю скорость и температуру газа через $M_i^\pm$, а именно [2]

$$n = \{M_0\}^\pm, \quad (1,33)$$

$$n\bar{U} = \{\bar{U}^*\}^\pm, \quad (1,34)$$

где

$$\{U_x^*\}^\pm = \{M_1\}^\pm, \quad \{U_y^*\}^\pm = \{M_2\}^\pm, \quad \{U_z^*\}^\pm = \{M_3\}^\pm, \quad (1,35)$$

$$\frac{3nT}{2h} = \{M_4 + M_5 + M_6\}^\pm - nU^2. \quad (1,36)$$

Из (1,32) — (1,36) следует, что параметры газа будут найдены, если известны $a_m^\pm$. Рассмотрим поэтому систему интегральных уравнений (1,29). Для этой системы можно провести метод итераций для определения $a_m^{(n)\pm}$ по следующей схеме:

$$a_m^{(n)\pm} = \iint_{\Omega^\pm} \Psi_m^\pm V^\pm f_{n-1}^\pm d\bar{u}, \quad n=1, 2, \dots; m=0, 1, 2, \dots \quad (1,37)$$

где n — номер приближения.

В качестве нулевого приближения для f возьмем максвелловскую функцию распределения f_0 , которая характеризует течение невозмущенного набегающего потока. Это означает, что коэффициенты $a_m^\pm$ в нулевом приближении имеют вид

$$a_0^{(0)-} = 1, \quad a_0^{(0)+} = 0, \quad a_k^{(0)\pm} = 0, \quad \text{при } k = 1, 2, \dots \quad (1,38)$$

Подставляя эти выражения для $a_m^\pm$ в (1,20) — (1,28), получим для N , Q и Φ в нулевом приближении

$$N^{(0)} = \beta_0^-, \quad Q^{(0)} = A_0^-, \quad \Phi^{(0)} = B_{00}^-, \quad (1,39)$$

где β_0^- , A_0^- и B_{00}^- могут быть вычислены по (1,22), (1,25) и (1,28). $\Phi^{(0)}$ можно найти иначе. Для невозмущенного внешнего потока в силу равновесности выражений (1,38) и (1,39) имеет место формула [1]

$$\Phi^{(0)} = Q^{(0)-} f_0 = Q^{(0)} f_0 = A_0^- f_0. \quad (1,40)$$

Отсюда видно, что для определения $N^{(0)}$, $Q^{(0)}$, $\Phi^{(0)}$ нужно вычислить только трехкратные интегралы β_0^- и A_0^- .

Для $a_m^\pm$ в первом приближении имеем

$$a_m^{(1)\pm} = \iint_{\Omega^\pm} \Psi_m^\pm V^\pm f_0^\pm d\bar{u}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (1,41)$$

Подставляя (1,39) и (1,40) в (1,1) и принимая во внимание (1,3) — (1,6), получим для $V^\pm f_0^\pm$:

$$V^- f_0^- = f_0 J_1(\bar{r}, \bar{u}), \quad (1,42)$$

$$V^+ f_0^+ = f_0^* \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) + f_0 J_2(\bar{r}, \bar{u}), \quad (1,43)$$

где

$$J_k(\bar{r}, \bar{u}) = \int_0^{\bar{k}} A_0^-(\bar{r} - \tau\bar{u}, \bar{u}) \exp \left\{ - \int_0^{\bar{k}} A_0^-(\bar{r} - q\bar{u}, \bar{u}) dq \right\} d\tau, \quad (1,44)$$

$$k = 1, 2; \quad \tau_1 = \infty, \quad \tau_2 = \tau_s,$$

$$f_0^* = \frac{1}{u_n} \beta_0^- \tilde{T}(\bar{u}), \quad (1,45)$$

$$\Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) = \exp \left\{ - \int_0^{\tau_s} A_0^-(\bar{r} - q\bar{u}, \bar{u}) dq \right\}. \quad (1,46)$$

Интегралы (1,44) легко вычисляются

$$J_k(\bar{r}, \bar{u}) = 1 - e^{-z_k(\bar{r}, \bar{u})}, \quad k = 1, 2, \quad (1,47)$$

где $z_1 = \infty$ и $z_2 = \int_0^{\tau_s} A_0^-(\bar{r} - q\bar{u}, \bar{u}) dq$.

Подставляя (1,47) в (1,42) и (1,43), будем иметь

$$V^- f_0^- = f_0, \quad (1,48)$$

$$V^+ f_0^+ = f_0 + \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) [f_0^* - f_0]. \quad (1,49)$$

Подставляя теперь (1,48) и (1,49) в (1,41) и принимая во внимание (1,14) — (1,19), получим для $a_m^{(1)\pm}$ следующие выражения:

$$a_0^{(1)-} = \alpha_{00}^-, \quad a_k^{(1)-} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (1,50)$$

$$a_m^{(1)+} = \bar{a}_m^{(1)+} + \tilde{a}_m^{(1)+}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \quad (1,51)$$

где

$$\bar{a}_m^{(1)+} = \iiint_{\Omega^+} \psi_m^+ f_0^* \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) d\bar{u}, \quad (1,52)$$

$$\tilde{a}_0^{(1)+} = \alpha_{00}^+ + \gamma_0^+, \quad \tilde{a}_k^{(1)+} = \gamma_k^+, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (1,53)$$

$$\gamma_m^+ = - \iiint_{\Omega^+} \psi_m^+ f_0 \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) d\bar{u}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (1,54)$$

С помощью коэффициентов $a_m^{(1)\pm}$ можно теперь найти выражения для макропараметров газа в первом приближении. Как видно из (1,33) — (1,36), все макропараметры газа выражаются через $\{M_i\}^\pm$. Подставляя (1,50) — (1,54) в (1,32) и принимая во внимание (1,14) и (1,17), можно $\{M_i^{(1)}\}^\pm$ записать в виде

$$\{M_i^{(1)}\}^\pm = \{\alpha_{i0}\}^\pm + \gamma_i^+ + \eta_i^+, \quad i = 0, 1, 2, \dots, \quad (1,55)$$

где

$$\alpha_{i0}^\pm = \iiint_{\Omega^\pm} f_0 \varphi_i d\bar{u}, \quad (1,56)$$

$$\gamma_i^+ = - \iiint_{\Omega^+} \varphi_i f_0 \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) d\bar{u}, \quad (1,57)$$

$$\eta_i^+ = \iiint_{\Omega^+} \varphi_i f_0^* \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) d\bar{u}. \quad (1,58)$$

Рис. 2.

Следовательно, макропараметры газа будут окончательно вычислены, если будут найдены значения интегралов (1,56) — (1,58). Все эти интегралы можно асимптотически оценить, если $h \rightarrow \infty$.

Вернемся теперь к нашей задаче о гиперзвуковом обтекании полубесконечной пластинки. В рассматриваемом случае исходим из уравнений (1,1), где $u_n = u_y$ и $\tau_s = \frac{y}{u_y}$. Функция распределения f терпит разрыв на некоторой конической поверхности (рис. 2), которая делит пространство скоростей на две части Ω^+ и Ω^- . Поэтому функцию распределения можно представить в виде разложения (1,12), а макропараметры газа выразить через $\{M_i\}^\pm$, для которых в первом приближении имеем формулу (1,55), причем

$$\alpha_{i0}^+ = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\frac{u_y}{\gamma}} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\gamma}} \varphi_i f_0 d\bar{u}, \quad (1,59)$$

$$\alpha_{i0}^- = \alpha_{i0}^{*-} + \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\gamma u_x} \int_0^{\infty} \varphi_i f_0 d\bar{u}, \quad (1,60)$$

$$\gamma_i^+ = - \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\frac{u_y}{\gamma}} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\gamma}} \varphi_i f_0 \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) d\bar{u}, \quad (1,61)$$

$$\gamma_{i\bar{i}}^+ = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\bar{i}}} \varphi_i f_0^* \Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) d\bar{u}, \quad (1,62)$$

где

$$\alpha_{00}^* = \alpha_{10}^* = \frac{1}{2}, \quad \alpha_{20}^* = -\frac{1}{2\sqrt{\pi h}}, \quad \alpha_{30}^* = 0, \quad (1,63)$$

$$\alpha_{40}^* = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2h} \right), \quad \alpha_{50}^* = \alpha_{60}^* = \frac{1}{4h}$$

и по (1,45) и (1,46)

$$f_0^* = \frac{2h^2}{\pi} \beta_0^- e^{-hu^2}, \quad (1,64)$$

$$\Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) = \exp \left\{ - \int_0^{\frac{u_y}{\bar{i}}} A_0^-(\bar{r} - q\bar{u}, \bar{u}) dq \right\}, \quad (1,65)$$

β_0^- и A_0^- вычисляются по (1,22) и (1,25), т. е.

$$\beta_0^- = - \int \int \int_{\frac{u_y}{\bar{i}} < 0} u_y f_0 d\bar{u} = \frac{1}{2\sqrt{\pi h}}, \quad (1,66)$$

$$A_0^- = \frac{1}{2} |\bar{u} - \bar{U}_0| + \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\tau_x} \int_0^{\infty} f_0(\bar{u}_1) |\bar{u} - \bar{u}_1| d\bar{u}_1 \approx$$

$$\approx \frac{1}{2} |\bar{u} - \bar{U}_0| (1 + \operatorname{erf} \sqrt{h} \bar{r}). \quad (1,67)$$

A_0^- оценивалось по методу Лапласа при $h \rightarrow \infty$. Подставляя (1,66) и (1,67) в (1,64) и (1,65), получим

$$f_0^* = \left(\frac{h}{\pi} \right)^{3/2} e^{-hu^2}, \quad (1,68)$$

$$\Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) = \exp \left\{ - \frac{1}{2} |\bar{u} - \bar{U}_0| \left[\frac{y}{u_y} + \int_0^{\frac{u_y}{\bar{i}}} \operatorname{erf} \left(\sqrt{h} \frac{y - qu_y}{x - qu_x} \right) dq \right] \right\}. \quad (1,69)$$

Переходя в интеграле в (1,69) от интегрирования по q к интегрированию по $t = \frac{y - qu_y}{x - qu_x}$, интегрируя потом по частям и оценивая полученный интеграл по методу Лапласа при $h \rightarrow \infty$, получим для Π_0

$$\Pi_0(\bar{r}, \bar{u}, \tau_s) \approx e^{-A_0^- \frac{y}{u_y}}. \quad (1,70)$$

Принимая во внимание (1,13), (1,67), (1,68) и (1,70), запишем интегралы (1,59) — (1,62) в виде:

$$\alpha_{i0}^+ = \left(\frac{h}{\pi} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\bar{i}}} \varphi_i e^{-h(\bar{u} - \bar{U}_0)^2} d\bar{u}, \quad (1,71)$$

$$\alpha_{i0}^- = \alpha_{i0}^* + \left(\frac{h}{\pi} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\tau_x} \int_0^{\infty} \varphi_i e^{-h(\bar{u} - \bar{U}_0)^2} d\bar{u}, \quad (1,72)$$

$$\gamma_i^+ = -\left(\frac{h}{\pi}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\gamma}} \varphi_i e^{-h(\bar{u}-\bar{U}_0)^2} \exp \times \\ \times \left\{ -\frac{1}{2} |\bar{u} - \bar{U}_0| \frac{y}{u_y} (1 + \operatorname{erf} \sqrt{h}\gamma) \right\} d\bar{u}, \quad (1,73)$$

$$\eta_i^+ = \left(\frac{h}{\pi}\right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\gamma}} \varphi_i e^{-hu^2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} |\bar{u} - \bar{U}_0| \frac{y}{u_y} (1 + \operatorname{erf} \sqrt{h}\gamma) \right\} d\bar{u}, \quad (1,74)$$

где α_{i0}^* определяются по (1,63).

Займемся теперь вычислением трех основных макропараметров газа $n^{(1)}$, $\bar{U}^{(1)}$, $T^{(1)}$ в первом приближении, т. е. вычислим интегралы (1,71) — (1,74) для $i = 0, 1, \dots, 6$.

§ 2. Асимптотика α_{i0}^+ и γ_i^+ ($i = 0, 1, \dots, 6$)

Асимптотическая оценка интегралов $\alpha_{i0}^{\pm}$ проводилась в [2] и мы здесь сразу выпишем полученные там результаты. Для α_{i0}^- имеем

$$\alpha_{00}^- \approx \frac{1}{2} (1 + \operatorname{erf} \sqrt{h}\gamma), \quad \alpha_{10}^- \approx \alpha_{00}^-, \quad \alpha_{20}^- \approx -\frac{e^{-h\gamma^2}}{2\sqrt{\pi h}} = \alpha_0^-, \quad (2,1)$$

$$\alpha_{30}^- = 0, \quad \alpha_{40}^- \approx \alpha_{00}^- \left(1 + \frac{1}{2h}\right), \quad \alpha_{50}^- \approx \gamma \alpha_{20}^- + \frac{\alpha_{00}^-}{2h}, \quad \alpha_{60}^- = \frac{\alpha_{00}^-}{2h}.$$

Далее

$$\alpha_{00}^+ \approx \frac{1}{2} (1 - \operatorname{erf} \sqrt{h}s), \quad s = \sin \psi = \frac{\gamma}{\sqrt{1+\gamma^2}},$$

$$\alpha_{10}^+ \approx \alpha_{00}^+ - \alpha_0^+ s, \quad \alpha_0^+ = \frac{e^{-hs^2}}{2\sqrt{\pi h}},$$

$$\alpha_{20}^+ \approx \alpha_0^+ \cos \psi,$$

$$\alpha_{30}^+ = 0,$$

$$\alpha_{40}^+ \approx \alpha_{10}^+ - s \alpha_{20}^+ \cos \psi + \frac{\alpha_{00}^+}{2h}, \quad (2,2)$$

$$\alpha_{50}^+ \approx s \alpha_{20}^+ \cos \psi + \frac{\alpha_{00}^+}{2h},$$

$$\alpha_{60}^+ = \frac{\alpha_{00}^+}{2h}.$$

Эти формулы верны для $\gamma \geq 0$. Из (2,1) и (2,2) видно, что все $\alpha_{i0}^{\pm}$ могут быть выражены через $\alpha_0^{\pm}$ и $\alpha_{00}^{\pm}$. Слагаемые в формулах для $\alpha_{i0}^{\pm}$ играют не одинаковую роль. Так, например, первое слагаемое в формуле для α_{50}^+ является главным при $\sqrt{h}s \rightarrow \infty$, а второе слагаемое становится главным, когда $\sqrt{h}s \rightarrow 0$. Этот факт говорит о том, что мы имеем дело с неравномерным асимптотическим поведением α_{i0}^+ вблизи пластинки. Когда $\gamma \rightarrow 0$, формулы (2,1) и (2,2) переходят в формулы для α_{i0}^{*} , которые были получены для случая обтекания бесконечной пластинки [3].

Найдем теперь выражения для γ_i^+ . По (1,73) и принимая во внимание (2,1), имеем

$$\gamma_i^+ = - \left(\frac{h}{\pi} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\gamma} \varphi_i e^{-h(\bar{u}-\bar{U}_0)^2} \exp \left\{ - \frac{y\alpha_{00}^-}{u_y} |\bar{u} - \bar{U}_0| \right\} du. \quad (2,3)$$

При оценке интегралов по u_z по методу Лапласа при $h \rightarrow \infty$, мы получим следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \gamma_3^+ &= 0, \quad \gamma_6^+ \approx \frac{\gamma_0^+}{2h}, \\ \gamma_i^+ &= - \frac{h}{\pi} \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\gamma} \varphi_i(u_x, u_y) e^{-h[(u_x-1)^2 + u_y^2]} \exp \times \\ &\times \left\{ - \frac{y\alpha_{00}^-}{u_y} \sqrt{(u_x-1)^2 + u_y^2} \right\} du_x du_y, \quad (2,4) \\ &i = 0, 1, 2, 4, 5. \end{aligned}$$

После замены переменных интегрирования u_x, u_y на ξ, η по формулам

$$\begin{aligned} u_x &= 1 + \xi \cos \psi - \eta \sin \psi, \\ u_y &= \xi \sin \psi + \eta \cos \psi \end{aligned} \quad (2,5)$$

для γ_i^+ получим (см. рис. 3)

$$\gamma_i^+ = - \frac{h}{\pi} \int_s^{\infty} \int_{-\frac{\eta}{\gamma}}^{\infty} \varphi_i(\xi, \eta) e^{-h(\xi^2 + \eta^2)} \exp \left\{ - y\alpha_{00}^- \frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{\xi \sin \psi + \eta \cos \psi} \right\} d\xi d\eta. \quad (2,6)$$

Рис. 3.

Отсюда видно, что точкой, в которой подынтегральная функция принимает максимальное значение, является точка $\xi_0 = 0, \eta_0 = s$. Поэтому, исследуя интегралы в окрестности точки (ξ_0, η_0) по методу Лапласа при $h \rightarrow \infty$, получим

$$\gamma_i^+ \approx \alpha_{i0}^+ F(\bar{r}, h), \quad (2,7)$$

где

$$F(\bar{r}, h) = - e^{-\frac{y\alpha_{00}^-}{\cos \psi}} = - e^{-y\alpha_{00}^- \sqrt{1+\gamma^2}} \quad (2,8)$$

Когда $\gamma \rightarrow 0$, формулы (2,7) переходят в выражения для $-\alpha_{i0}^{+*}$, полученные в [3]. Если ввести обозначения

$$n_s = \eta_0^+, \quad n_s U_{sx} = \eta_1^+, \quad n_s U_{sy} = \eta_2^+, \quad (2,9)$$

$$n_s T_s = n_s (T_{sx} + T_{sy} + T_{sz}) = \eta_4^+ + \eta_5^+ + \eta_6^+$$

и принять во внимание (1,33) — (1,36), (1,55), (2,1), (2,2) и (2,7), для макропараметров газа в первом приближении получим следующие асимптотические формулы:

$$\begin{aligned} n^{(1)} &\approx \alpha_{00}^- + \alpha_{00}^+ (1 + F) + n_s, \\ U_x^{(1)} &\approx 1 + \frac{1}{n^{(1)}} \left\{ n_s (U_{sx} - 1) - \frac{\alpha_0^+ \gamma}{\sqrt{1+\gamma^2}} (1 + F) \right\}, \end{aligned}$$

$$U_y^{(1)} \approx \frac{1}{n^{(1)}} \left\{ \alpha_0^- + \frac{\alpha_0^+}{\sqrt{1+\gamma^2}} (1+F) + n_s U_{sy} \right\}, \quad (2,10)$$

$$T^{(1)} \approx \frac{2h}{3n^{(1)}} \left\{ \alpha_{00}^- \left(1 + \frac{3}{2h} \right) + \gamma \alpha_0^- + (1+F) \left[\alpha_{00}^+ \left(1 + \frac{3}{2h} \right) - \frac{\alpha_0^+ \gamma}{\sqrt{1+\gamma^2}} \right] + n_s T_s - n^{(1)} U^{(1)2} \right\}.$$

Окончательно параметры газа вычисляются по этим формулам, если найдены n_s , U_{sx} , U_{sy} , T_s . В следующем параграфе займемся определением этих величин.

§ 3. Асимптотическое поведение функций n_s , U_{sx} , U_{sy} , T_s при $h \rightarrow \infty$

Исследуем теперь асимптотику n_s , U_{sx} , U_{sy} , T_s при $h \rightarrow \infty$, $y \geq 0$. По (2,9), (1,74) и (2,1) имеем для плотности потока частиц, рожденных на стенке, следующее выражение:

$$n_s(x, y, h) = \left(\frac{h}{\pi} \right)^{\frac{3}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\frac{u_y}{\gamma}} \exp \left\{ -hu^2 - |\bar{u} - \bar{U}_0| \frac{y}{u_y} \alpha_{00}^- \right\} d\bar{u}. \quad (3,1)$$

После оценки интегралов по u_x и u_z по методу Лапласа при $h \rightarrow \infty$ получим

$$n_s \approx \frac{1}{2} n_s^* + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{h}{\pi}} \int_0^{\infty} \exp \left\{ -hu_y^2 - \frac{y}{u_y} \sqrt{1+u_y^2} \alpha_{00}^- \right\} \operatorname{erf} \left(\sqrt{h} \frac{u_y}{\gamma} \right) du_y. \quad (3,2)$$

Заменяя переменную интегрирования на $t = \sqrt{h} u_y$, мы легко раскроем неравномерность асимптотики интеграла (3,2) при $y \rightarrow 0$. Имеем:

$$n_s \approx \frac{1}{2} (n_s^* + \tilde{n}_s), \quad (3,3)$$

где

$$\tilde{n}_s = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t^2 - \frac{\alpha}{t}} \operatorname{erf} \left(\frac{t}{\gamma} \right) dt, \quad (3,4)$$

$$\alpha = \sqrt{h} y \alpha_{00}^-, \quad (3,5)$$

а n_s^* и все в дальнейшем обозначенные через „*“ величины получены для случая обтекания бесконечной пластинки в [4], с (3,5) вместо α .

n_s является функцией двух параметров α и γ . Дальнейшее асимптотическое исследование проводится по параметру α , который при больших h может принимать любые неотрицательные значения. Асимптотика проводится при больших и малых α [5], [6]. При $\alpha \rightarrow \infty$ де-

лается замена переменных $t = \alpha^{\frac{1}{3}} \xi$ и интеграл оценивается потом по методу Лапласа при $\alpha \rightarrow \infty$. Когда $\alpha \rightarrow 0$, для вычисления $\tilde{n}_s$ применяется преобразование Лапласа к интегралу (3,4). Если же $y = o(M^{-1})$, то $\tilde{n}_s$ надо вычислять численно.

После асимптотического исследования интеграла (3,4), и принимая во внимание формулы для n_s^* [4], получим для n_s

$$n_s \approx \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{-3\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{2/3}} \left\{ 1 + \operatorname{erf} \left[\frac{1}{\gamma} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/3} \right] \right\} \left[1 + o\left(\alpha^{-2/3}\right) \right], & \alpha \rightarrow \infty, \\ \frac{1}{4} \left(1 + \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{\gamma} \right) + o(\alpha \ln \alpha), & \alpha \rightarrow 0. \end{cases} \quad (3,6)$$

Если в (3,6) $\gamma \rightarrow 0$, то эти формулы переходят в асимптотические выражения для n_s^* [4].

Если принять во внимание (2,9) и затем оценить в (1,74) интегралы по u_x и u_z по методу Лапласа и сделать потом замену переменных $t = \sqrt{h} u_y$, то для остальных макропараметров газа будем иметь

$$n_s U_{sx} \approx n_s^* U_{sx}^* - \frac{\gamma}{2\sqrt{\pi h} \sqrt{1 + \gamma^2}} n_s^*(\beta), \quad (3,7)$$

$$n_s U_{sy} \approx \frac{1}{2} \left(n_s^* U_{sy}^* + \tilde{n}_s \tilde{U}_{sy} \right), \quad (3,8)$$

$$n_s T_s \approx \frac{1}{2} \left(n_s^* T_s^* + \tilde{n}_s \tilde{T}_s \right) - \frac{\gamma}{2\sqrt{\pi h} (1 + \gamma^2)} n_s^*(\beta) U_{sy}^*(\beta), \quad (3,9)$$

где

$$\tilde{n}_s \tilde{U}_{sy} = \frac{1}{\sqrt{\pi h}} \int_0^\infty t e^{-t^2 - \frac{\alpha}{t}} \operatorname{erf} \left(\frac{t}{\gamma} \right) dt, \quad (3,10)$$

$$\tilde{n}_s \tilde{T}_s = \frac{1}{h\sqrt{\pi}} \int_0^\infty (1 + t^2) e^{-t^2 - \frac{\alpha}{t}} \operatorname{erf} \left(\frac{t}{\gamma} \right) dt, \quad (3,11)$$

$$n_s^*(\beta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2 - \frac{\beta}{t}} dt, \quad (3,12)$$

$$n_s^*(\beta) U_{sy}^*(\beta) = \frac{1}{\sqrt{\pi h}} \int_0^\infty t e^{-t^2 - \frac{\beta}{t}} dt, \quad (3,13)$$

$$\beta = \alpha \sqrt{1 + \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{h} \rho \alpha_{00}, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (3,14)$$

Из (3,7) и (3,9) видно, что $n_s U_{sx}$ и $n_s T_s$ зависят от трех параметров α , γ и β , причем β по (3,14) является комбинацией α и γ . Ввиду неравномерности асимптотики при $y \rightarrow 0$ и $\rho \rightarrow 0$, все интегралы можно, как и в [6], асимптотически исследовать для больших и малых α и β . При этом ввиду (3,5) и (3,14) будем иметь три области асимптотики, а именно: 1) $\alpha \rightarrow \infty$ и $\beta \rightarrow \infty$, 2) $\alpha \rightarrow 0$ и $\beta \rightarrow \infty$, 3) $\alpha \rightarrow 0$ и $\beta \rightarrow 0$. Последняя область означает окрестность носка пластинки. В ней функции от β дают вклад в главный член асимптотики. Во второй области (т. е. в пограничном слое, под которым понимаем бесконечно тонкий слой, исчезающий вместе с характеризующим его параметром α) остаются функции от α , а функции от β исчезают, так как они стремятся экспоненциально к нулю при $\beta \rightarrow \infty$. В первой области функции от α и выражения, зависящие от β , имеют одинаковый порядок.

Оценивая (3,7)–(3,9) по методам, изложенным в [4] и [6], получим

$$\begin{aligned}
 n_s U_{sx} &\approx \\
 \approx &\left\{ \begin{aligned}
 &\frac{1}{\sqrt{3h}} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{2}{3}} e^{-3\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} \left[1 + o\left(\alpha^{-\frac{2}{3}}\right)\right] - \frac{\gamma}{2\sqrt{3\pi h} \sqrt{1+\gamma^2}} e^{-3\left(\frac{\beta}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} \times \\
 &\quad \times \left[1 + o\left(\beta^{-\frac{2}{3}}\right)\right], \alpha \rightarrow \infty, \beta \rightarrow \infty; \\
 &-\frac{\alpha}{2\sqrt{\pi h}} \left\{\ln \alpha + \frac{3}{2} C + o(\alpha)\right\}, \alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty; \\
 &-\frac{\alpha}{2\sqrt{\pi h}} \left\{\ln \alpha + \frac{3}{2} C + o(\alpha)\right\} - \frac{\gamma}{2\sqrt{\pi h} \sqrt{1+\gamma^2}} \times \\
 &\quad \times \left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \beta \ln \beta + o(\beta)\right\}, \alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0;
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}
 \tag{3,15}$$

$$\begin{aligned}
 n_s U_{sy} &\approx \\
 \approx &\left\{ \begin{aligned}
 &\frac{1}{2\sqrt{3h}} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{3}} e^{-3\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} \left\{1 + \operatorname{erf}\left[\frac{1}{\gamma} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{3}}\right]\right\} \left[1 + o\left(\alpha^{-\frac{2}{3}}\right)\right], \alpha \rightarrow \infty; \\
 &\frac{1}{4\sqrt{\pi h}} \left\{1 + \frac{1}{\sqrt{1+\gamma^2}} - \alpha \sqrt{\pi} \left(1 + \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{\gamma}\right) + o(\alpha^2 \ln \alpha)\right\}, \alpha \rightarrow 0;
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}
 \tag{3,16}$$

$$\begin{aligned}
 n_s T_s &\approx \\
 \approx &\left\{ \begin{aligned}
 &\frac{1}{2\sqrt{3h}} \left[1 + \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{2}{3}}\right] e^{-3\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} \left\{1 + \operatorname{erf}\left[\frac{1}{\gamma} \left(\frac{\alpha}{2}\right)^{\frac{1}{3}}\right]\right\} \left[1 + o\left(\alpha^{-\frac{2}{3}}\right)\right] - \\
 &\quad - \frac{\gamma \left(\frac{\beta}{2}\right)^{\frac{1}{3}}}{2\sqrt{3\pi h} (1+\gamma^2)} e^{-3\left(\frac{\beta}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} \left[1 + o\left(\beta^{-\frac{2}{3}}\right)\right], \alpha \rightarrow \infty, \beta \rightarrow \infty; \\
 &\frac{1}{h} \left\{\frac{1}{4} \left(1 + \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{\gamma}\right) + \frac{1}{4} \left[1 - \frac{1}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \gamma - \frac{\gamma}{1+\gamma^2}\right)\right] + o(\alpha \ln \alpha)\right\}, \\
 &\quad \alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty; \\
 &\frac{1}{h} \left\{\frac{1}{4} \left(1 + \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{\gamma}\right) + \frac{1}{4} \left[1 - \frac{1}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \gamma - \frac{\gamma}{1+\gamma^2}\right)\right] + o(\alpha \ln \alpha)\right\} - \\
 &\quad - \frac{\gamma}{2\pi h (1+\gamma^2)} \left\{1 - \sqrt{\pi} \beta - \beta^2 \ln \beta + o(\beta^2)\right\}, \alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0.
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}
 \tag{3,17}$$

Когда рассматриваются параметры газа в точках далеко от носка пластинки, т. е. когда $\gamma \rightarrow 0$, формулы (3,15)–(3,17) переходят в асимптотические выражения, полученные для бесконечной пластинки [4]. Оказывается, что порядок толщины пограничного слоя такой же, как в случае бесконечной пластинки [4], т. е. обратно пропорционален M , что следует из состояния перехода от одной асимптотики (дальней) к другой (ближней). Внутренняя структура слоя характеризуется интегралами типа (3,3), (3,7)–(3,13). Вблизи носка пластинки макропараметры газа существенно зависят от γ . Подставляя (3,6), (3,15)–(3,17) в (2,10), окончательно получим выражения для макропараметров газа в первом приближении.

§ 4. Примеры

На рис. 4 имеются графики безразмерной плотности газа $n^{(1)}$ в зависимости от расстояния y от поверхности пластинки при $M=22$ и разных значениях расстояния x от передней кромки пластинки. Расчет проводился при $x=10^{-2}$; 0,5; 2; 10^2 ; 10^3 следующим образом.

Рис. 4.

Фиксировались $h = \frac{5}{6} M^2$ и x . По ним вычислялись для разных y величины $\gamma = \frac{y}{x}$ и α (3,5). Далее определили $n^{(1)}$ по (2,10), причем, когда $0 \leq \alpha \leq 8 \cdot 10^{-2}$, пользовались формулой для n_s при $\alpha \rightarrow 0$, а когда $3 \leq \alpha \leq \infty$ брали ту же формулу для $\alpha \rightarrow \infty$. При $\alpha = o(1)$ n_s была вычислена по (3,3) численно по методу Гаусса, аналогично [7]. Рассматривая поведение кривых для $n^{(1)}$ с учетом формулы (2,10), можно сделать следующие выводы. Во всех сечениях x плотность $n^{(1)}$ переходит при $y \rightarrow \infty$ в значения для плотности в невозмущенном набегающем потоке (нулевое приближение), причем этот процесс при малых x осуществляется быстрее, чем при больших x . Вблизи стенки $n^{(1)}$ претерпевает резкие изменения. При малых x , т. е. вблизи носка пластинки, $n^{(1)}$ при увеличении y сначала резко возрастает до максимального значения, а потом убывает и стремится к единице при $y \rightarrow \infty$. Это значит, что $n^{(1)}$ вблизи носка пластинки существенно зависит от $\gamma = \frac{y}{x}$. Для точек далеко от носка пластинки (большие x) $n^{(1)}$ ведет себя как в случае с бесконечной пластинкой [3], т. е. при увеличении y сначала резко убывает до минимального значения, а потом возрастает и стремится к значению в невозмущенном потоке при $y \rightarrow \infty$. Областью максимума $n^{(1)}$ (при малых x) и областью минимума $n^{(1)}$ (при больших x) является область, в которой $\alpha = o(1)$.

Summary

The non-uniform asymptotic values of gas macroparameters near the surface and the leading edge of a plate are investigated as a first approximation by means of the method of paper [2], M being large.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Аэродинамика разреженных газов», Сб. I. Под ред. С. В. Валландера. Изд. ЛГУ, 1963.
2. Ю. Шлажа. Метод моментов при гиперзвуковом обтекании тел разреженным газом. Вестник ЛГУ, № 7, 1966.
3. J. Szlaza. Hyperschallumströmung einer unendlichen Platte durch verdünntes Gas. Monatsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1966 (im Druck).
4. Р. Г. Баранцев, Ю. Шлажа. К асимптотической структуре пограничного слоя при больших M . Вестник ЛГУ, № 19, 1964.
5. M. Abramowitz. Evaluation of the integral $\int_0^{\infty} e^{-t^2 - \frac{x}{t}} dt$. J. of Math. and Phys., **32**, No 2/3, 188, 1953.
6. J. Szlaza. Zur asymptotischen Struktur der Grenzschicht am vorderen Ende einer halbumendlichen Platte für grosse Machzahlen. ZAMM, Bd. 45, H. 2/3, 1965.
7. П. В. Мелентьев. Приближенные вычисления. М., Физматгиз, 1962.

Статья поступила в редакцию 3 июня 1966 г.